


La mesure du volume




Le volume correspond à la place occupée par un objet ou une matière dans l'espace.

Le volume d'un liquide se mesure à l'aide d'un récipient gradué, comme un verre doseur, en lisant la graduation atteinte.



Le volume d'une poudre se mesure de la même manière, en la versant dans un récipient gradué.

Pour mesurer le volume d'un solide, on utilise la méthode du déplacement de liquide : on mesure d'abord le volume d'eau, puis on plonge entièrement le solide dans l'eau. Le niveau de l'eau monte. La différence entre le volume avant et après correspond au volume du solide, car le solide occupe une place dans l'eau.




La mesure du volume




Le volume correspond à la place occupée par un objet ou une matière dans l'espace.

Le volume d'un liquide se mesure à l'aide d'un récipient gradué, comme un verre doseur, en lisant la graduation atteinte.



Le volume d'une poudre se mesure de la même manière, en la versant dans un récipient gradué.

Pour mesurer le volume d'un solide, on utilise la méthode du déplacement de liquide : on mesure d'abord le volume d'eau, puis on plonge entièrement le solide dans l'eau. Le niveau de l'eau monte. La différence entre le volume avant et après correspond au volume du solide, car le solide occupe une place dans l'eau.




La mesure du volume



Le volume correspond à la place occupée par un objet ou une matière dans l'espace.

Le volume d'un liquide se mesure à l'aide d'un récipient gradué, comme un verre doseur, en lisant la graduation atteinte.



Le volume d'une poudre se mesure de la même manière, en la versant dans un récipient gradué.

Pour mesurer le volume d'un solide, on utilise la méthode du déplacement de liquide : on mesure d'abord le volume d'eau, puis on plonge entièrement le solide dans l'eau. Le niveau de l'eau monte. La différence entre le volume avant et après correspond au volume du solide, car le solide occupe une place dans l'eau.

